

Tabell 1. Östergötland

| Uppföljningsperspektiv  | Indikator  | Position  | Procentuell    |       | Faktiskt värde |           | Högsta värde | Lägsta värde | Variationsvidd |  |
|---|--|-----------|----------------|-------|----------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--|
|   |  | 1 till 7  | avvikelse      |       | Östergötland   | Rikssnitt |              |              |                |  |
|   |  | 8 till 14 | från rikssnitt |       |                |           |              |              |                |  |
| 15 till 21  |  |           |                |       |                |           |              |              |                |  |
| <b>A Medicinska resultat</b>  |  |           |                |       |                |           |              |              |                |  |
| Allmänna indikatorer inkl. vaccinationer, screening                     | 1a. Åtgärdbar dödlighet 2001-2004 per 100 000 inv. Hälsopolitisk indikator. Kvinnor              | ▲         | -14,1          | 23,3  | 27,2           | 38,2      | 20,9         | 63,7         |                |  |
|   | 1b. Åtgärdbar dödlighet 2001-2004 per 100 000 inv. Hälsopolitisk indikator. Män                  | ▲         | -14,3          | 39,5  | 46,0           | 57,3      | 36,4         | 45,6         |                |  |
|   | 2a. Åtgärdbar dödlighet 2001-2004 per 100 000 inv. Sjukvårdspolitisk indikator. Kvinnor          | ▲         | -7,5           | 23,8  | 25,7           | 34,8      | 19,8         | 58,5         |                |  |
|   | 2b. Åtgärdbar dödlighet 2001-2004 per 100 000 inv. Sjukvårdspolitisk indikator. Män              | ▲         | -2,1           | 36,0  | 36,8           | 49,8      | 26,9         | 62,4         |                |  |
|   | 3a. Antal pers. med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 inv. 2004-2006. Kvinnor         | ▲         | -7,5           | 816   | 882            | 987       | 816          | 19,3         |                |  |
|   | 3b. Antal pers. med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 inv. 2004-2006. Män             | ▲         | -7,4           | 1029  | 1111           | 1252      | 1029         | 20,1         |                |  |
| Läkemedelsanvändning  | 4. Andel MPR-vaccinerade barn, barn födda 2004.  | ▲         | 1,4            | 97,5  | 96,2           | 98,2      | 93,1         | 5,3          |                |  |
|   | 5. Influensavaccinering av äldre, säsongen 2006/2007.  | ▲         | -2,3           | 55,0  | 56,3           | 66,0      | 44,3         | 38,6         |                |  |
|   | 6. MRSA-fall per 100 000 inv., 2005-2006, inhemska fall.   | ▲         | 94,3           | 13,2  | 6,8            | 13,2      | 1,5          | 171,8        |                |  |
|   | 7. Andelen äldre med 10 eller fler läkemedel, okt.-dec. 2006.                                    | ▲         | -8,7           | 15,0  | 16,4           | 20,4      | 11,5         | 54,4         |                |  |
|   | 8. Andelen äldre med tre eller flera psykofarmaka, okt.-dec. 2006.                               | ▲         | -16,5          | 5,37  | 6,43           | 8,16      | 3,87         | 66,7         |                |  |
|   | 9. Andelen äldre med läkemedel med risk för D-interaktioner, okt.-dec. 2006                      | ▲         | -8,1           | 4,06  | 4,41           | 5,44      | 3,48         | 44,4         |                |  |
| Cancersjukvård  | 10. Andel kvinnor behandlade med kinoloner vid urinvägsinfektion, 2006.                          | ▲         | -4,3           | 23,5  | 24,6           | 30,5      | 18,4         | 49,1         |                |  |
|   | 11. 5-årsöverlevnad i bröstcancer, 1999-2005.  | ▼         | -0,1           | 86,7  | 86,8           | 88,9      | 83,8         | 5,9          |                |  |
|   | 12a. 5-årsöverlevnad i tjocktarmscancer, 1999-2005. Kvinnor                                      | ▼         | -12,6          | 52,6  | 60,2           | 68,5      | 49,5         | 31,6         |                |  |
|   | 12b. 5-årsöverlevnad i tjocktarmscancer, 1999-2005. Män  | ▲         | -3,5           | 54,2  | 56,2           | 65,6      | 43,1         | 39,9         |                |  |
|   | 13a. 5-årsöverlevnad i ändtarmscancer, 1999-2005. Kvinnor  | ▼         | -0,6           | 60,4  | 60,8           | 75,7      | 48,2         | 45,3         |                |  |
|   | 13b. 5-årsöverlevnad i ändtarmscancer, 1999-2005. Män  | ▼         | -13,5          | 48,7  | 56,3           | 62,6      | 48,7         | 24,7         |                |  |
| Förlossningsvård, mödrhälsovård   | 14. Ändtarmscancer - andel reoperationer inom 30 dagar, 2001-2005.                               | ▼         | -46,1          | 5,5   | 10,2           | 14,9      | 0,0          | 146,1        |                |  |
|   | 15. Prostatacancer - andel som fått kurativt syftande behandling, 2005.                          | ▼         | -10,6          | 62,5  | 69,9           | 84,9      | 50,0         | 49,8         |                |  |
|   | 16. Andel aborter före 9:e graviditetsveckan, samt varav farmakologiska, 2004-2006.              | ▲         | 4,7            | 75,9  | 72,5           | 80,5      | 65,6         | 20,5         |                |  |
|   | 17. Antal dödfödda per 1000 födda barn, 2001-2005.   | ▲         | 12,6           | 3,70  | 3,29           | 4,36      | 2,43         | 58,9         |                |  |
|   | 18. Antal döda inom 28-dygnet per 1000 levande födda, 2001-2005.                                 | ▲         | -2,2           | 2,03  | 2,08           | 4,03      | 1,14         | 138,9        |                |  |
|   | 19. Andel födda med låg Apgar-poäng vid 5 minuter, 2001-2005.                                    | ▲         | 22,6           | 1,39  | 1,13           | 1,63      | 0,67         | 84,4         |                |  |
| Diabetesvård  | 20. Andel bristningar av graden III och IV vid vaginal förlossning, 2001-2005.                   | ▲         | 25,0           | 5,02  | 4,02           | 5,39      | 2,58         | 70,0         |                |  |
|   | 21. Andel diabetiker som når mål för HbA1c, 2006.  | ▲         | 10,5           | 60,8  | 55,0           | 61,4      | 38,0         | 42,5         |                |  |
|   | 22. Andel diabetiker som når mål för blodtryck, 2006.  | ▲         | 9,8            | 36,0  | 32,8           | 36,8      | 23,8         | 39,6         |                |  |
|   | 23. Andel diabetiker med blodtryckssänkande läkemedelsbehandling, 2006.                          | ▲         | 1,7            | 74,2  | 73,0           | 77,7      | 70,1         | 10,3         |                |  |
| Strokesjukvård  | 24. Andel diabetiker med blodfettssänkande läkemedelsbehandling, 2006.                           | ▲         | 7,4            | 53,6  | 49,9           | 55,6      | 39,7         | 31,9         |                |  |
|   | 25a. Dödlighet inom 28 dagar efter stroke, 2002-2004. Kvinnor                                    | ▲         | 9,1            | 25,6  | 23,4           | 28,9      | 19,0         | 41,9         |                |  |
|   | 25b. Dödlighet inom 28 dagar efter stroke, 2002-2004. Män  | ▲         | 4,3            | 23,7  | 22,8           | 27,7      | 18,1         | 41,9         |                |  |
|   | 26a. Dödlighet inom 28 dagar efter stroke, 2004-2006. Sjukhusvårdade pat. Kvinnor                | ▲         | 7,1            | 15,8  | 14,7           | 19,4      | 11,7         | 52,2         |                |  |
|   | 26b. Dödlighet inom 28 dagar efter stroke, 2004-2006. Sjukhusvårdade pat. Män                    | ▲         | 1,4            | 15,0  | 14,8           | 20,0      | 10,0         | 67,4         |                |  |
|   | 27a. Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet, 2006. Kvinnor                             | ▲         | 13,3           | 90,9  | 80,0           | 96,2      | 68,9         | 34,1         |                |  |
|   | 27b. Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet, 2006. Män                                 | ▲         | 8,0            | 89,6  | 83,0           | 100,0     | 73,0         | 32,6         |                |  |
|   | 28. Andel strokepatienter som var ADL-beroende 3 månader efter akutfasen, 2006.                  | ▲         | -15,8          | 17,3  | 20,5           | 28,4      | 17,1         | 54,6         |                |  |
|   | 29a. Andel strokepat. med hjärtflimmer med blodförtunn. behandl., jan.-jun. 2007. Kvinnor        | ▲         | 39,4           | 56,9  | 40,8           | 60,7      | 32,4         | 69,4         |                |  |
|   | 29b. Andel strokepat. med hjärtflimmer med blodförtunn. behandl., jan.-jun. 2007. Män            | ▲         | 25,8           | 63,2  | 50,2           | 76,9      | 42,6         | 68,4         |                |  |
| Hjärtsjukvård   | 30. Återinskrivningar för strokesjukvård inom 365 dagar efter stroke, 2001-2005.                 | ▲         | -23,5          | 7,4   | 9,7            | 11,6      | 7,4          | 42,5         |                |  |
|   | 31a. Dödlighet inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, 2002-2004. Kvinnor                              | ▲         | 1,6            | 30,7  | 30,3           | 35,5      | 25,6         | 32,8         |                |  |
|   | 31b. Dödlighet inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, 2002-2004. Män                                  | ▲         | 2,4            | 33,8  | 33,0           | 37,2      | 26,4         | 32,5         |                |  |
|   | 32a. Dödlighet inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, 2004-2006, sjukhusvårdade pat. Kvinnor          | ▲         | 12,8           | 17,0  | 15,1           | 18,7      | 12,0         | 44,7         |                |  |
|   | 32b. Dödlighet inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, 2004-2006, sjukhusvårdade pat. Män              | ▲         | 1,8            | 16,4  | 16,1           | 19,9      | 13,8         | 37,7         |                |  |
|   | 33a. Andel reperusionsbehandl. patienter vid ST-höjningsinfarkt, 2006. Kvinnor                   | ▲         | 18,1           | 83,5  | 70,7           | 87,5      | 36,0         | 72,8         |                |  |
|   | 33a. Andel reperusionsbehandl. patienter vid ST-höjningsinfarkt, 2006. Män                       | ▲         | 9,3            | 81,3  | 74,3           | 89,1      | 56,1         | 44,4         |                |  |
|   | 34a. Andel kranskärlsröntgade patienter vid icke ST-höjningsinfarkt, 2006. Kvinnor               | ▲         | -13,1          | 60,4  | 69,4           | 86,2      | 45,8         | 58,1         |                |  |
|   | 34b. Andel kranskärlsröntgade patienter vid icke ST-höjningsinfarkt, 2006. Män                   | ▲         | -5,4           | 72,4  | 76,5           | 89,9      | 50,0         | 52,1         |                |  |
|   | 35a. Andel clopidogrelbehandlade patienter vid icke ST-höjningsinfarkt, 2006. Kvinnor            | ▲         | -11,5          | 66,9  | 75,7           | 92,2      | 62,8         | 38,9         |                |  |
| Ortopedisk sjukvård   | 35b. Andel clopidogrelbehandlade patienter vid icke ST-höjningsinfarkt, 2006. Män                | ▲         | -3,3           | 81,3  | 84,1           | 94,0      | 71,2         | 27,1         |                |  |
|   | 36a. Hjärtkirurgi – medianväntetid till operation, 2006. Kvinnor                                 | ▼         | 44,8           | 42,0  | 29,0           | 60,0      | 11,0         | 200,0        |                |  |
|   | 36b. Hjärtkirurgi – medianväntetid till operation, 2006. Män                                     | ▼         | -31,8          | 15,0  | 22,0           | 52,0      | 10,0         | 190,9        |                |  |
|   | 37a. Andel pat. med blodfettssänk. behandl. efter hjärtinfarkt, jan.-jun. 2007. Kvinnor          | ▲         | 4,4            | 84,3  | 80,7           | 90,1      | 66,0         | 29,8         |                |  |
|   | 37b. Andel pat. med blodfettssänk. behandl. efter hjärtinfarkt, jan.-jun. 2007. Män              | ▲         | 2,1            | 87,1  | 85,3           | 93,2      | 72,4         | 24,4         |                |  |
|   | 38. Knäledplastik - revisioner inom 1 år p.g.a. infektion, 1996-2005.                            | ▲         | -38,8          | 1,78  | 2,91           | 5,78      | 0,00         | 198,3        |                |  |
|   | 39. Knäledplastik - risk för revision inom 5 år, 1996-2005.                                      | ▲         | -39,3          | 1,86  | 3,07           | 5,34      | 1,43         | 127,6        |                |  |
|   | 40. Total höftledplastik - andel implantat som överlever 10 år, 1992-2006.                       | ▲         | 1,8            | 94,7  | 93,0           | 96,7      | 85,8         | 11,7         |                |  |
|   | 41. Total höftledplastik - omoperation inom 2 år, alla orsaker, 2003-2006.                       | ▲         | -30,3          | 1,1   | 1,5            | 3,4       | 0,5          | 187,5        |                |  |
|   | 42. Total höftledplastik - patientskattat resultat av operation, 2003-2006.                      | ▲         |                |       | 0,36           | 0,44      | 0,34         | 27,8         |                |  |
| Annan behandling  | 43. Höftfraktur - andel pat. som skrivs ut till ursprungligt boende efter sjukhusvistelse, 2006. | ▲         | 17,3           | 61    | 52             | 68        | 38           | 57,7         |                |  |
|   | 44. Höftfraktur - medelväntetid till operation, dygn, 2006.                                      | ▲         | -16,7          | 1,0   | 1,2            | 1,8       | 0,8          | 83,3         |                |  |
|   | 45. Ljumskräck – relativ risk för omoperation, 1992-2006.  | ▲         |                | 0,99  |                | 1,86      | 0,24         | 162,0        |                |  |
|   | 46a. Kataraktoper. - andel med synskärpa under 0,5 på bästa ögat, 2006. Kvinnor                  | ▲         | 38,7           | 33,8  | 24,4           | 34,1      | 16,0         | 73,9         |                |  |
|   | 46b. Kataraktoper. - andel med synskärpa under 0,5 på bästa ögat, 2006. Män                      | ▲         | 39,5           | 31,0  | 22,2           | 31,0      | 14,9         | 72,7         |                |  |
|   | 47. Antal självmord el. (självmonds)-försök per 100 000 inv. ett. psyk. sl.-vård, 2002-2006.     | ▲         | -14,3          | 11,7  | 13,7           | 19,2      | 7,7          | 83,7         |                |  |
|   | 48. Årstörningsvård - andel förbättrade ett år efter behandlingsstart, 2003-2006.                | ▲         | 10,5           | 34,7  | 31,4           | 75,0      | 0,0          | 238,8        |                |  |
|   | <b>B Patienterfarenheter</b>   |           |                |       |                |           |              |              |                |  |
| Befolkning  | 1. Andel i befolkningen som anser sig ha tillgång till den vård man behöver, 2006.               | ▼         | -2,9           | 71,8  | 73,9           | 82,5      | 68,8         | 18,7         |                |  |
|   | 2. Andel i befolkningen som har förtroende för vården vid vårdcentraler (motsv.), 2006.          | ▼         | -1,5           | 52,2  | 53,0           | 63,5      | 50,6         | 24,3         |                |  |
|   | 3. Andel i befolkningen som har förtroende för vården vid sjukhus, 2006.                         | ▼         | -2,1           | 65,1  | 66,5           | 74,1      | 56,2         | 27,0         |                |  |
| Patienter   | 4. Sammanfattande betyg på besök vid vårdcentral (motsv.), 2006.                                 | ▼         | 0,6            | 78,4  | 78,0           | 85,1      | 73,0         | 15,5         |                |  |
|   | 5. Sammanfattande betyg på besök vid mottagning/klirik vid sjukhus, 2006.                        | ▼         | -6,6           | 78,3  | 83,8           | 92,1      | 78,3         | 16,4         |                |  |
|   | 6. Andel som anser att man fick den hjälp man förväntat sig - alla besök, 2006.                  | ▼         | -3,1           | 79,9  | 82,4           | 88,3      | 79,9         | 10,3         |                |  |
|   | 7. Andel som anser att väntetiden var rimlig vid besök på vårdcentral (motsv.), 2006.            | ▼         | -7,0           | 72,3  | 77,8           | 87,0      | 72,3         | 18,9         |                |  |
| Strokepatienter   | 8. Andel som anser att det var lätt att komma fram till vårdcentral (motsv.) per telefon, 2006.  | ▼         | -0,4           | 62,5  | 62,7           | 75,8      | 45,7         | 48,0         |                |  |
|   | 9a. Andel strokepat. som var nöjda el. mycket nöjda med vården vid sjukhuset, 2006. Kvinnor      | ▲         | 5,2            | 95,4  | 90,7           | 100,0     | 83,0         | 18,8         |                |  |
|   | 9b. Andel strokepat. som var nöjda el. mycket nöjda med vården vid sjukhuset, 2006. Män          | ▲         | 0,7            | 93,3  | 92,7           | 97,4      | 83,6         | 15,0         |                |  |
|   | 10a. Andel strokepatienter som är nöjda med rehabiliteringen, 2006. Kvinnor                      | ▲         | 0,5            | 73,7  | 73,3           | 89,9      | 62,3         | 37,6         |                |  |
| 10b. Andel strokepatienter som är nöjda med rehabiliteringen, 2006. Män | ▲  | -6,7      | 70,9           | 76,0  | 91,8           | 68,0      | 31,3         |              |                |  |
| <b>C Tillgänglighet</b>   |  |           |                |       |                |           |              |              |                |  |
| Primärvård  | 1. Andel patienter som fick läkarbesök i primärvården inom 7 dagar, mars 2007.                   | ▲         | -1,1           | 87,0  | 88,0           | 97,0      | 78,0         | 21,6         |                |  |
|   | 2. Andel patienter som fick läkarbesök i primärvården samma dag, mars 2007.                      | ▼         | -4,5           | 63,0  | 66,0           | 77,0      | 55,0         | 33,3         |                |  |
| Specialiserad vård  | 3. Antal pat. som väntat längre än 90 dagar per 1000 inv. - mottagning, 30 april 2007.           | ▲         | 3,7            | 7,2   | 7,0            | 12,2      | 2,9          | 133,9        |                |  |
|   | 4. Antal pat. som väntat längre än 90 dagar per 1000 inv. - behandling, 30 april 2007.           | ▲         | 20,9           | 3,1   | 2,5            | 6,5       | 0,4          | 240,2        |                |  |
| <b>D Kostnader</b>  |  |           |                |       |                |           |              |              |                |  |
| Kostnad per invånare  | 1. Hälso- och sjukvårdskostnad per invånare, exkl. hemsjukv. och tandvård, 2006, kr.             | ▲         | -10,5          | 16307 | 18210          | 20786     | 16307        | 24,6         |                |  |
|   | 2. Faktisk hälso- och sjukvårdskostnad per inv. 2006 i relation till förväntad kostnad.          | ▲         | -8,8           | 91,2  | 100,0          | 114,7     | 90,8         | 23,9         |                |  |
|   | 3. Kostnader för primärvård per invånare, 2006, kr.  | ▲         | 3,8            | 3050  | 2939           | 4109      | 2529         | 53,8         |                |  |
|   | 4. Kostnader för specialiserad somatisk vård per invånare, 2006, kr.                             | ▲         | -12,5          | 8603  | 9837           | 12008     | 8603         | 34,6         |                |  |
|   | 5. Kostnader för specialiserad psykiatrisk vård per invånare, 2006, kr.                          | ▲         | -26,9          | 1285  | 1758           | 2230      | 1238         | 56,4         |                |  |
|   | 6. Hälso- och sjukvårdskostnad per inv. Förändring 2004-2006 i löpande priser.                   | ▲         | 3,1            | 10,3  | 7,3            | 12,9      | 5,8          | 7,1          |                |  |
| Kostnad per prestation  | 7. Kostnad per (konsumerad) DRG-poäng, Spec. somatisk vård, 2006, kr.                            | ▲         | -4,5           | 40028 | 41924          | 48425     | 36414        | 28,6         |                |  |
|   | 8. Årlig förändring av kostnad per DRG-poäng 2004-2006 i fasta priser.                           | ▲         | 1,9            | 0,4   | -1,5           | 1,2       | -4,5         | 5,7          |                |  |
|   | 9. Kostnad per viktad vårdkontakt i primärvård, 2006, kr.  | ▲         | 18,7           | 1447  | 1220           | 1609      | 1042         | 46,5         |                |  |
| Kostnadseffektiva behandlingsval  | 10. Andel omeprazolbehandling vid magsår, 2006.  | ▲         | 11,6           | 77,0  | 69,0           | 83,9      | 49,7         | 49,5         |                |  |
|   | 11. Andel val av läggkostnadsstatiner vid blodfettssänkande behandling, 2006.                    | ▲         | 3,5            | 83,7  | 80,9           | 88,6      | 75,4         | 16,2         |                |  |
|   | 12. Andel framtalsoperationer utförda i dagkirurgi, 2006.  | ▲         | 343,7          | 44,6  | 10,0           | 55,2      | 0,0          | 550,0        |                |  |
|   | 13. Andel ljumskräckoperationer utförda i dagkirurgi, 2006.                                      | ▲         | 17,0           | 90,7  | 77,5           | 93,9      | 65,5         | 36,7         |                |  |